

ممکن است مرگ به علت خفگی که در اثر فلنج شدن دستگاه تنفس است بوجود آید.

### روش تشخیص :

چون گزش همه عنکبوتها خطرناک نیست لذا آوردن عنکبوتی که فرد را مورد گزش قرارداده به درمانگاه. از نظر تشخیص آن و کمک به درمان حائز اهمیت است.

### اصول کلی پیشگیری از عنکبوت گزیدگی:

تمیز نگهدارتن محیط زندگی و ممانعت از تجمع حشراتی که شکار مناسبی برای عنکبوتها محسوب می شوند.

اجتناب از قرار دادن عضاء از بدن در نقاط و حفراتی که دید کافی نداشته و احتمال حضور عنکبوت نیز وجود دارد.

استفاده از پوشش مناسب (دستکش، چکمه و غیره) به هنگام باغبانی و انجام کارهای مشابه کنترل لباسها و کفشها قبل از پوشیدن و همچنین کنترل رختخواب قبل از ورود به آن

### اهمیت بهداشتی و بیماری‌زایی عنکبوت‌ها:

عنکبوت‌ها قادرند به یکی از سه روش زیر به انسان آسیب برسانند:


۱. از طریق نیش دردناک خود

۲. واکنش‌های التهاب آور ناشی از فرو رفتن موها

به پوست

۳. از طریق تزریق سم

گزش بیوه سیاه معمولاً خیلی دردناک نیست و ممکن است احساس نشود ولی پس از آن لکه های قرمز، تورم موضعی و آماس بوجود می آید. حدود پانزده دقیقه تا سه ساعت پس از تزریق سم علائم بالینی شامل درد شدید عضلات خصوصاً "در ناحیه شکم، عرق، تهوع، فشار در امتداد سینه، اشکال در تنفس و گاهی تکلم دیده می شود که پس از چند روز این علائم رفع می شود.



عنکبوت‌ها در همه جا و تمامی نقاطی که انسان در آنجا زندگی و یا کار می کند حضور دارند. ظاهر ترسناک و بد هیبت برخی از عنکبوت‌ها باعث گردیده تا مردم عقاید نادرستی در مورد آنها پیدا کنند. در حالیکه به جز گونه های محدودی بقیه نه تهاب‌برای انسان بی آزار هستند بلکه در کنترل آفات کشاورزی و یا انتقال بیماری ها نقش مفیدی دارند.



بدن عنکبوت‌ها دو قسمتی است و غدد نیش در قطعات دهانی آنها واقع شده است. غدد تارریس نیز در انتهای شکم آنها وجود دارد. عنکبوت‌ها دارای چهار جفت پا هستند و جفت پنجم یک عضو حسی است. بعضی از عنکبوت‌ها از جمله عنکبوت بیوه سیاه سمی و خطرناک هستند که در ایران نیز این نوع عنکبوت وجود دارد. در خراسان به آن دلمک گویند. بدن این عنکبوت سیاه رنگ است و در بعضی گونه ها علامتها رنگی خاصی در قسمت شکمی دیده می شود.

## کمکهای اولیه

استفاده از باندهای تحت فشار و روش‌های مشابه که جهت تاخیر جذب زهر به کار می‌روند بی‌فایده است. همچنین اقدامات نادرستی نظیر شکافتن، مکیدن و سوزاندن نیز مخاطره آمیز است و انجام آن توصیه نمی‌شود. قرار دادن کیسه یخ در موضع گزش در مراحل اولیه احتمالاً درد را تخفیف می‌دهد. بی‌حرکت کردن عضو گزیده شده و ارجاع بیمار به یک مرکز درمانی بهترین اقدام است.

## توجه

لازم به ذکر است رطیلها که دارای بدنه پرم و درشت و شکمی کشیده و سیلندر مانند هستند قادر غده سمی و دستگاه تزریق زهر می‌باشند. این جانوران در جلوی سر به جای نیش دارای آرواره‌های قوی هستند که برای شکار استفاده می‌شود و حتی توسط آن قادرند انسان را نیز مورد حمله و آسیب قرار دهند.



تهیه و تنظیم: مریم حکیمی

## درمان

در کشور ما سرم اختصاصی عنکبوت وجود ندارد لذا بهترین راه علائم درمانی است که شامل کنترل درد برگرداندن وضعیت عضلات به حالت طبیعی و درمان داروئی است. کارهای درمانی عبارتند از:

- شستشوی محل گزش
- استفاده از پیش گیرنده‌های کراز
- استفاده از آرام بخش جهت تسکین درد
- استفاده از آنتی بیوتیکها در مورد عفونتهای ثانویه

بسمه تعالیٰ



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران  
دانشکده بهداشت و انسیتو تحقیقات بهداشتی  
گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین



## عنکبوت‌های سمی

آدرس: تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت و انسیتو تحقیقات بهداشتی، طبقه دوم، گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین.

ص.پ. ۱۴۱۵۵-۶۴۴۶

تلفن: ۰۲۱-۸۹۵۱۳۹۳ و ۰۲۱-۶۱۱۳۲۶۳

دورنگار: ۰۲۱-۶۴۶۲۲۶۷



پست الکترونیکی: medentomo@sina.tums.ac.ir