



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مركز مشاوره



دانشگاه تبریز
مركز مشاوره دانشجویان

سوء مصرف

تراژدی اول

بهار ۱۳۸۵



نشانی: تهران، خیابان ۱۶ آذر، خیابان ادوارد براون، پلاک ۲۱

فکس: ۶۴۱۶۱۲۰

وب سایت مرکز مشاوره دانشگاه تهران: <http://counseling.ut.ac.ir>

خدمات مشاوره تلفنی: ۲ - ۸۲۰۹۵۷۰۱ و ۸۸۰۲۳۳۸۸ (سه خط)

۱۶ الی ۲۱ حتی ایام تعطیل

ترامادول

ترامادول یک ماده ضد درد برای دردهای حاد یا مزمن با شدت متوسط تا نسبتاً شدید است که تأثیر مستقیم خود را بر سیستم اعصاب مرکزی (مغز و نخاع) می‌گذارد. این ماده در ایران به صورت کپسول‌های ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم و آمپول‌های ۱ و ۲ میلی گرم تولید می‌شود. ترامادول پس از مصرف خوراکی به سرعت جذب می‌شود و اثر ضد درد آن در حالت خوراکی پس از ۲ تا ۳ ساعت به حداکثر می‌رسد و تا ۶ ساعت ادامه پیدا می‌کند.

مصرف همزمان این ماده با مشروبات الکلی، تریاک و مشتقات آن و همچنین داروهای آرامبخش نظیر اگزاپام، دیازپام، لورازپام و ... بسیار خطرناک است چرا که سبب کاهش شدید اعمال و کنش‌های مغز و تنفس طبیعی می‌گردد. ترامادول می‌تواند سبب وابستگی و اعتیاد شود. همانند سایر مواد ترامادول نیز سبب بروز اشتیاق و تمایل روانی و ایجاد حالت تحمل یعنی نوعی اجبار به افزایش میزان ماده جهت رسیدن به حالت نشستگی، می‌شود. اگر فرد مصرف کننده این ماده به یک باره مصرف آن را قطع کند، در وی علائم جسمی و روانی محرومیت از ماده (که نشان دهنده اعتیاد فرد به ترامادول می‌باشد) بروز می‌کند.

ترامادول نیز سبب بروز اشتیاق و تمایل روانی و ایجاد حالت تحمل یعنی نوعی اجبار به افزایش میزان ماده جهت رسیدن به حالت نشستگی، می‌شود

این علائم عبارتند از:

- اضطراب
- عرق کردن
- بی خوابی
- درد اندام‌ها
- حالت تهوع
- لرزش
- اسهال

- و در مواردی بروز توهم

برخی از علائمی که کمتر مشاهده می‌گردند عبارتند از:

- حمله‌های اضطرابی
- اضطراب شدید
- بی حس شدن اندام‌ها



نویسنده: دکتر فرهاد طارمیان