




وزارت خارجه، نهضت اسلامی و هنری
دکل جمهوری اسلامی

سوء مصرف

قرص‌های ریتالین

(متیل فندايت)



پیاره ۱۳۸۵



مدارت پاکشونی و فرهنگی
مرکز مبارزه با تنشی

- = نامنظم شدن ضربان قلب و تنفس گه در مواردی می‌تواند به شکل خطرناکی ادامه پیدا کند
- تکرار حرکات و اعمال بی‌هدف
- بروز حالت‌های پارانویید (سوء‌ظن)، توهمندی و هذیان
- احساس حرکت و جلیل حشرات در زیر پوست
- مرگ (تاکنون در چند مورد سوء مصرف ریتالین منجر به مرگ شده است)

نویسنده: دکتر فرهاد طارمیان

عوارض مصرف خودسرانه این قرص‌ها می‌تواند در حد مواد دیگر
نظیر کوکائین و آمفتابین باشد

نشانی: تهران، خیابان ۱۶ آذر، خیابان ادووارد براؤن، بلاک ۲۱

فکس: ۶۴۱۶۱۳۰

وب‌سایت مرکز مشاوره داشگاه تهران: <http://counseling.ut.ac.ir>

خدمات مشاوره تلفنی: ۰۱-۰۸۰۹۵۷۰-۰۸۸-۲۳۳۸۸ (سه خط)

۱۶ الی ۲۱ حتی تمام تعطیل

- تغییرات ضربان قلب و فشار خون (که معمولاً به صورت افزایش است ولی در مواردی نیز به شکل کاهش دیده می‌شود)
- خارش و جوش‌های پوست
- دردهای شکمی، کاهش وزن و مشکلات معده
- مصرف دائمی و اعتیاد (وابستگی)
- بروز حالت‌های روان پریشی (جنون) و علائم وابستگی به ریتالین
- بروز افسردگی پس از قطع مصرف

عارض مصرف مقادیر زیاد ریتالین:

- از دست دادن اشتها و سوء تغذیه
- لرزش و پرش عضلات
- تب، تنفس و سردرد



قرص‌های ریتالین (متیل فندایت)

قرص‌های ریتالین در وهله اول برای درمان یکی از انواع اختلال بیمارهای روانی دوران کودکی به نام «بیش فعالی همراه با نقص توجه» استفاده می‌شود، در موقعی نیز توسط پزشکان برای درمان بیماران مبتلا به «حمله خواب» تجویز می‌شود ولی در سال‌های اخیر مصرف خود سرانه این دارو در کشور ما رو به افزایش گذاشته است که عدم آگاهی از آثار و ویژگی‌های این قرص می‌تواند نگران کننده باشد. هم اکنون گزارش‌های متعددی وجود دارد که برخی از افراد برای بیدار ماندن در شباهای امتحان به جای مصرف قهوه و چای از قرص‌های ریتالین استفاده می‌کنند. شواهد متعدد حاکی از آن است که این افراد از این قرص‌ها استفاده می‌کنند تا بتوانند چندین ساعت متواالی بیدار بمانند و به شکل غیر معمولی تمرکز خود را در مدت طولانی حفظ کنند.

آثار مصرف ریتالین:

از آنجاکه ریتالین دارویی است که توسط پزشکان تجویز می‌شود، مصرف کلندگان تصور می‌کنند این قرص‌ها بی‌خطرند و آن «بد نامی» مواد مخدر را ندارند. در حالی که عوارض مصرف خودسرانه این قرص‌ها می‌تواند در حد مواد دیگر نظیر کوکائین و آمفتابین باشد. شایع‌ترین عوارض مصرف خودسرانه قرص‌های ریتالین عبارتند از:

- عصبی شدن و بی‌خوابی
- حالت تهوع و استفراغ
- احساس سرگیجه و سردرد