

Emergency Contraception

E.C

روش اورزانس پیشگیری از بارداری

این روش توسط کارکنان بهداشتی آموزش دیده تجویز می‌گردد.

موارد استفاده از روش

- پس از تماس جنسی بدون استفاده از یک روش مطمئن پیشگیری از بارداری
- در هر موردی که احتمال بارداری ناخواسته پس از تماس جنسی وجود داشته باشد.

از قبیل:

- پارکی کاندوم
- خروج آی یودی در زمانی غیر از خونریزی قاعده‌گی
- استفاده از روش طبیعی یا منقطع با شک به تماس جنسی که می‌تواند منجر به بارداری گردد.

عارضه شایع

تبوع و استقراغ عارضه شایع این روش می‌باشد که بهتر است از نیم ساعت قبل و با فواصل ۶ ساعت پس از مصرف هر دوز این دارو، از داروی ضد تبوع مثل قرص دیمن هیدرینات ۵۰-۲۵ میلی گرم (۳-۴ قاشق غذا خوری کوچک در روز) استفاده شود.

توجه

- بهتر است قرص‌ها با شکم خالی خورده نشود.
- در صورت استقراغ، تا ۲ ساعت پس از استفاده از روش، خوردن مجدد قرص‌ها ضروری است.
- حداقل دفعات مجاز استفاده از این روش در هر سیکل قاعده‌گی یک بار است.

اثربخشی روش

هرچه فاصله زمانی استفاده از این روش با زمان تماس جنسی محافظت نشده، کوتاهتر باشد، اثربخشی آن بیشتر خواهد بود.

موارد منع مصرف

- حاملگی
 - موارد منع مصرف استروژن، میکرن، ترومیوز و ریدهای عمقی
 - تعدد تماس‌های جنسی بدون پیشگیری
- زمان و چگونگی استفاده از روش اوروزانس پیشگیری از بارداری

نام قرص	ذوبت اول (بهرast قبل از 12 ساعت پس از وقوع نزدیکی بدون پیشگیری استفاده شود)	ذوبت دوم (12 ساعت پس از صرف ذوبت اول)
ال دی (L.D)	۴ قرص	۴ قرص
اچ دی (H.D)	۲ قرص	۲ قرص
تری فازیک (سفیدرنک)	۴ قرص	۴ قرص

پیشگیری

در صورت شروع نشدن قاعدگی در طی ۳ هفته پس از استفاده از این روش، جهت بررسی و انجام آزمایش حاملگی، به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایید.

شماره تلفن ۱۴۹ در تهران به طور شبانه روزی
آماده پاسخ گویی به سوالات شما می‌باشد.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
گروه تخصصی تغذیه، بهداشت و تنظیم خانواده

تهریه کننده: سپیلا فروزانفر - کارشناس بهداشت خانواده