

سالک



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت سلامت
مرکز مدیریت بیماریها

با اقدامات حفاظتی از قبیل نصب توری
پشت پنجره‌ها و خوابیدن در پشه بند
با بیماری سالک مبارزه کنیم.

با دفع صحیح و بموضع زباله و جلوگیری
از ایناشته شدن آن از ابتلا به سالک
پیشگیری کنیم.



- جمع آوری و دفع مستمر و صحیح پedaشتی (باله) (استفاده از سطل زباله درب دار) و فضولات حیوانی و جلوگیری از ایناشته شدن آنها.
- اجتناب از رفتن به مناطق آلوده به پشه خاکی یا جنگلهای البره پخصوص پس از غروب آفتاب.
- محافظت بدن از نیش پشه خاکی پس از غروب آفتاب بطريق نصب توری فلزی جهت درب و پنجره‌ها، استفاده از پشه بندهای معمولی و پشه بندهای آغشته به سسم، استفاده از پمادها و مواد دور کننده حشرات به هنگام کار و خواب.
- مبارزه با جوندگان و معدوم ساختن سکهای ولگرد.
- بهسازی و ترمیم شکافها و خفره‌های موجود در دیوارها و مناطق مسکونی انسان ودام.
- تخریب و تسطیع اماكن مخربه.
- محافظت رخم سالک با گاز استریل و درمان آن.



ناقل بیماری

ناقل بیماری سالک پشه ریزی بنام پشه خاکی یا فلبوتوموس است که اندازه آن حدود ۲-۳ میلیمتر بوده و در موقع نشستن بالهای خود را به شکل عدد ۷ نگه میدارد و بصورت چش پرواز میکند. پشه خاکی ماده از خون انسان و سایر پستانداران آلوده و یا از زخم افراد مبتلا به سالک تغذیه نموده و پس از مدتی میتواند آلوده‌گی را به انسان حساس منتقل نماید.



محل زندگی پشه خاکی

در طول روز در پناهگاههای گرم، تاریک و مرطوب، شکافهای عمیق دیوارها، اماکن متروکه مخربه، اصطبلها، اطراف توده‌های زباله، کودهای حیوانی، لانه چوندگان، پشت اشیاء ثابت منزل مانند کمد و قاب عکس استراحت نموده و در ساعات اولیه شب شروع به فعالیت خونخواری و تغذیه مینماید.



عامل بیماری

عامل بیماری انگل تک یا چهار یا است بنام لیشمانیا که در زخم‌های پوستی ناشی از این بیماری در انسان، چوندگان و سگ مبتلا به سالک وجود دارد. هنگام خونخواری پشه خاکی از زخم‌های سالک، انگل به داخل بدن پشه خاکی وارد شده و با نیش این پشه آلوده به انسان سالم منتقل میگردد.



مخزن بیماری

مخزن بیماری در سالک نوع شهری انسان است. سگ و خانواده سگ سازان (شغال و روباء) بطور اتفاقی به این بیماری مبتلا میگردند. در سالک نوع مرطوب یا روستایی منبع بیماری چوندگان و حشرات نظیر موشهاي صحرائی میباشد.



سالک چیست؟

سالک یک بیماری پوستی (مزمن، بدون درد و تب) مشترک بین انسان و تعدادی از حیوانات از جمله چوندگان و سگ من باشد که توسط پشه خاکی یعنی گام تغذیه از خون بیمار به این انگل آلوده میشود و بعد از گذشت یک هفته از طریق نیش زدن قادر به انتقال بیماری به فرد سالم است.

علائم بیماری

بیماری سالک بسته به تعداد محلهای گزش پشه بصورت یک زخم یا زخم‌های متعدد در نقاط باز بدن مانند صورت، بینی، گوش، دست و پا ایجاد میشود که ابتدا بصورت یک برآمدگی قرمز رنگ بوده، سپس به گره سفت و کبود رنگ تبدیل میشود و در صورت عدم درمان مناسب زخم شده و با پیبود هر زخم یک جوشگاه فرو رفته و پایدار بوجود میآید که به زیانی فرد لطمہ میزند.

