

## HIV شناسی و اینفکشن

- آمیزش چنسی با فرد آلوده بدون استفاده از کاندوم (از زن به مرد، از مرد به زن، از مرد به مرد)
- استفاده میتواند از سرطک و سوزن آلوده برای تزریق و یا استفاده مشترک از وسایل بربنده مثل تیغ
- انتقال فوت و فرزآوردهای فونی آلوده به ویروس HIV
- انتقال ویروس HIV از پدر آلوده به مادر (رابطه چنسی) و از مادر آلوده به کودک در دوران بارداری، زایمان و شیردهی.

## HIV اینفکشن از آینه ایم ای اف دی بی اس

### ملوکیتی گنیمه

- داشتن رابطه چنسی سلام.
- از بندهایی چنس فرد داری کنیم.
- استفاده از کاندوم در روابط چنسی.
- به یاد داشته باشید، کاندوم از مهمترین وسایل پیشگیری از ایدز است.
- از مواد مقدار و مهاد روانگردان مهری مانند اکستاسی (قرص X) و ... استفاده نکنیم، زیرا استفاده از این مواد می تواند قدرت تمثیم کننده را از سرطک و سوزن مشترک برای تزریق استفاده نکنیم.

## AIDS پیشست

ایدز یک بیماری غیرقابل درمان اما قابل پیشگیری است که توسط ویروس HIV منتقل می شود. ویروس HIV به تدریج قدرت دفاعی بدن را کم می کند به طوریکه بدن هنر در مقابل بیماری های خیلی فعیل هم نمی تواند مقاومت کند. بدین ترتیب فرد آلوده در ابتدا مرتباً دچار بیماری های جمیع و سپس بیماری های مزمم و نهایتاً عفونت های غیرعادی مرگ آور می شود. مرحله نهایی عفونت HIV را بیماری ایدز می نامند.



### پیشست ممکن است

### ای اف دی بی اس HIV شناسی و اینفکشن

(فتارهای پرخاطر مهمترین عامل آلودگی به ویروس HIV و ابتلا به بیماری ایدز است.)

- روابط چنس را افراد متعدد بدون استفاده از کاندوم
- استفاده از سرطک و سوزن مشترک برای تزریق و یا استفاده مشترک از وسایل بربنده مثل تیغ.
- استفاده از نوشیدنی های الکلی و مهدوم (تیریک، هشیش، کراس...) و مهاد روانگردان مهری مانند اکستاسی (قرص X) و ... که قدرت تمثیم کننده را از فرد سلب می کند.

## ظاهر شخص مبتلا به ویروس HIV از آنچه باید باشد



شخص آنوده به ویروس **HIV** ممکن است تا مدت‌ها سالم به نظر برسد اما من تواند تا ماه‌ها و یا سال‌ها قبل از ابتلای بیماری ایدا هامل ویروس **HIV** باشد. فرد در تمام این مدت من تواند بدون اطلاع از آنودگی خود با اتفاق (فتارهای پرقطر، عامل انتقال عفونت به دیگران) باشد.

## اگر فقط هشتمان و هفتادین ترا ریسی، آنها به ویروس HIV می‌شوند

- فیلم  
هر کسی من تواند به ویروس **HIV** آنوده شود:  
کسانی که (فتارهای پرقطر داشته باشند.  
کسانی که فرآورده‌های فونی آنوده دریافت گرده باشند.  
من بغض از کوکائی که از طریق آنودگی والدین خود در دوران مبتنی یا شیده‌وارگی مبتلا من شوند.

## از چه بدلیم اگر اینها شدند؟

مشاوره با متخصصین امر در این زمینه و انجام آزمایشات مربوطه با تشخیص تیم پژوهشی توجه داشته باشیم که نتایج آزمایشات کاملاً محرمانه خواهد بود.  
برای اکاهی از امکانات تشخیصی و درمانی در محل زندگی خود من توافق با مرکز زیر تماس بگیریم  
مراکز مشاوره زیر در تهران برای راهنمایی شما:

۰۶۰۳۸۹۲۰۰۱

۰۲۲۱۷۷۲۲

۰۶۹۳۰۰۴۰۰۹

۰۶۹۳۵۵۲۴

کلینیک والفجر  
کلینیک طالقانی مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری  
بیمارستان امام خمینی بخش عقوباتی  
خط احیاء مشاوره و مداخله تلفنی



برای اطلاع از مراکز مشاوره در شهرستانها، می‌توانیم  
با مرکز بهداشت شهرستان مرتبه تعاس بگیریم

**تذکر مهم:** از زمان ورود ویروس به بدن تا مثبت شدن جواب آزمایش خون  
ممکن است **۶ ماه** طول بکشد.



دانشگاه تهران  
معاونت دانشجویی و فرهنگی  
مرکز معاونه دانشجویی



## باید درباره ایدز صحبت کنیم



با خود آفید و یا همچوین HIV یا مبتلا به بیماری ایدز  
پنهان نمایند باشد رفته شو

ایدز هم مثل بقیه بیماریهاست.



تبیین قائل شدن بین مبتلایان به بیماری ایدز و  
دیگر بیماران کاری ناشایست است.

افراد مبتلا به ایدز  
نیاز به همایی فانواده - جامعه و  
همه مردم دارند.

**پراویز HIV از په طریق منتقل نشود**

ویروس HIV از راههای زیر منتقل نمی‌شود:

- دست دادن
- در آغوش گرفتن
- (وبوسی گردن)
- عطسه و سرفه کردن
- استفاده از توالت و یا حمام مشتری
- استفاده از ظروف و وسایل غذافوری مشتری
- استفاده از استفرعمومی
- نیش مشرات مانند پشه

**زنگی کنیم و بگذاریم زندگی کنند.**

بایایید دست در دست یکدیگر دهیم و این تعیض را بشکنیم.

Pishro Graphic  
33043753-58059735